

1歳まで

	生後 2ヵ月	生後 3ヵ月	生後 4ヵ月	生後 5ヵ月	生後 6ヵ月	生後 8ヵ月	1歳	1歳半
Hib(ヒブ) <small>不活化</small>	○	○	○				○	
小児肺炎球菌 <small>不活化</small>	○	○	○				○	
B型肝炎 <small>不活化</small>	○	○				○		
4種混合 <small>不活化</small>		○	○	○				○
BCG <small>生</small>					○※1			
風疹・麻疹 (MR) <small>生</small>							○※2	
水痘 (みずぼうそう) <small>生</small>							○※3	
ロタウイルス <small>生</small>	●	●	●					

- 定期接種の推奨期間
- 定期接種の接種可能な期間
- 任意接種の接種可能な期間

- ※1 BCC : 生後5ヵ月～1歳になるまで
 - ※2 麻疹・風疹(MR): I期(1歳～2歳) II期(5歳以上7歳未満)
 - ※3 水痘(みずぼうそう): 1歳～3歳になるまで
 - ロタウイルス: 生後24週までに計2回、生後32週までに計3回
- ※ロタウイルスワクチンは、2020年8月以降出生の赤ちゃんは定期接種(無料)となります

3歳以降

	3歳	4歳	5歳	7歳	9歳	10歳	11～12歳	中学 ～高校
4種混合 <small>不活化</small>								○
3種混合 <small>不活化</small>								○
2種混合 <small>不活化</small>							○	
日本脳炎 <small>不活化</small>	①	②	③		④			
風疹・麻疹 (MR) <small>生</small>			○					
子宮頸がん <small>不活化</small>								○※4

- 定期接種の推奨期間
- 定期接種の接種可能な期間
- 任意接種の接種可能な期間

- ※4 子宮頸がん: 中学1年～高校1年まで
- 日本脳炎: 合計4回接種 ※接種間隔に注意
I期(3歳～7歳半までに3回接種)
II期(9歳～12歳までに1回接種)